

ЭФОРИЯ, КС / Комбинированный инсектицид для листовых обработок, сочетающий системное и контактное действие тиаметоксама и лямбда-цигалотрина против комплекса сосущих и листогрызущих насекомых

Действующее вещество:	лямбда-цигалотрин + тиаметоксам, 106 + 141 г/л
Химический класс:	пиретроиды + неоникотиноиды
Класс опасности:	3
Упаковка:	канистра 5 л / 4×5 л
Срок хранения:	3 года со дня изготовления
Свидетельство о регистрации:	1713–09–101–018–0–1–1–0 (17.12.2019)
Регистрант:	ООО «Сингента»

Преимущества

- Высокая эффективность против всех видов вредителей: скрытноживущих, сосущих и листогрызущих
- Сокращение числа обработок за сезон
- Сохранение инсектицидной эффективности в сухую и жаркую погоду

Назначение: ЭФОРИЯ, КС — комбинированный инсектицид системно-контактного действия для уничтожения широкого спектра вредителей на зерновых культурах, капусте, горохе.

Регламенты применения: применять препарат в строгом соответствии с данными рекомендациями.

Культура	Объект	Норма расхода препарата, л, кг/га	Сроки ожидания, дни (кратность обработок)
		Способ обработки; *сроки выхода для ручных и механизированных работ, дни	
Горох	Гороховая плодожорка, гороховая зерновка	0,2–0,3	14(2)
		Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости — 200–400 л/га. * —(3)	
	Гороховая тля	0,2	14(2)
		Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости — 200–400 л/га. * —(3)	
Капуста	Капустная моль, капустная совка, белянки	0,2–0,3	30(2)
		Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости — 200–400 л/га. * —(3)	
	Капустная тля	0,2	30(2)
		Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости — 200–400 л/га.	

Культура	Объект	Норма расхода препарата, л,кг/га	Сроки ожидания, дни (кратность обработок)
		Способ обработки; *сроки выхода для ручных и механизированных работ, дни	
		* —(3)	
Овес	Пьявица	0,1	40(1)
		Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости — 200–300 л/га. * —(3)	
Пшеница	Вредная черепашка, хлебные жуки, внутростеблевые мухи, злаковые тли, пшеничный трипс, хлебные блошки	0,1–0,2	40(1)
		Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости — 200–300 л/га. * —(3)	
	Хлебная жужелица	0,2–0,3	40(1)
		Опрыскивание всходов. Расход рабочей жидкости — 100–200 л/га. * —(3)	
Ячмень	Пьявица, внутростеблевые мухи, злаковые тли	0,1–0,2	40(1)
		Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости — 200–300 л/га. * —(3)	

Совместимость с другими пестицидами (агрохимикатами): Совместим в баковых смесях с большинством инсектицидов, фунгицидов и гербицидов, применяемых в те же сроки. Однако в каждом конкретном случае смешиваемые препараты следует проверять на совместимость.

Период защитного действия: 2–4 недели (в зависимости от погодных условий, сроков применения и вида вредителей).

Скорость воздействия: Высокая, насекомые перестают питаться через 10–20 мин после обработки, полная гибель насекомых происходит через 2–4 часа.

Технология применения: Чистоту бака, магистральных трубопроводов и наконечников, а также исправность всего опрыскивателя проверяют до начала защитных работ. Затем определяют количество и равномерность подачи воды через наконечники и сравнивают с расчетными данными по расходу рабочей жидкости на 1 га. Опрыскивание производится в утренние или вечерние часы в безветренную погоду, не допуская сноса препарата на соседние культуры.

Применяйте **ЭФОРΙΑ, КС**, в максимальной норме расхода при высокой численности вредителей и при работе против имаго и личинок старших возрастов. Норма расхода рабочей жидкости должна быть достаточной для обеспечения покрытия всей листовой поверхности культуры, но не допускайте стекания препарата с обработанной поверхности. После окончания работ с препаратом тщательно промойте опрыскиватель и распыляющее оборудование.

Порядок приготовления рабочей жидкости: заполните ½ бака опрыскивателя чистой водой. Включите мешалку, добавьте рассчитанное и отмеренное количество препарата и продолжайте заполнение бака опрыскивателя с одновременным перемешиванием. Продолжайте перемешивание и во время обработки для обеспечения однородности рабочей смеси. При применении **ЭФОРΙΑ, КС** в баковой смеси с другими пестицидами, добавляйте препараты в воду в бак опрыскивателя в следующем порядке: *СП > ВДГ > СК > **ЭФОРΙΑ, КС** > КЭ (* — в случае применения в баковой смеси компонента в водорастворимой упаковке,

данный препарат растворить в баке опрыскивателя первым). Каждый последующий компонент добавляется после полного растворения предыдущего. Рабочий раствор должен быть использован в день приготовления.

Хранение препарата: Хранить препарат на специальных складах для пестицидов при температуре от -5°C до +35°C в невскрытой заводской упаковке.

Срок хранения: 3 года со дня изготовления.

Класс опасности: 3

Препарат слаботоксичен для птиц, токсичен для пчел и рыб. Запрещено применение препарата авиационными методами и в личных подсобных хозяйствах!

Запрещено применение в санитарной зоне вокруг рыбохозяйственных водоемов на расстоянии 500 м от границы затопления при максимальном стоянии паводковых вод, но не ближе 2 км от существующих берегов.

Необходимо избегать загрязнения водоемов и источников питьевой воды остатками препарата и водой, использованной для промывки тары и оборудования. Препарат не должен попадать в продукты питания и корма.

Класс опасности для пчел: 1 — высокоопасные для пчел пестициды.

Необходимо соблюдение следующего экологического регламента:

- проводить обработку растений вечером после захода солнца
- при скорости ветра — не более 1–2 м/с
- погранично-защитная зона лета для пчел — не менее 4–5 км
- ограничение лета пчел — не менее 4–6 суток

Купить по низкой цене: [GreenTerra.by](https://greenterra.by)

Самовывоз в минске; доставка курьером, почтой, европочтой.